



Nový genetický test!!!

SPAID (Shar Pei autoinflammatory disease) – iným názvom aj horúčka shar-peiov (Shar Pei fever)

Ochorenie

U plemena shar pei sa často symptómy ako horúčka a artritída dávajú do spojitosti s plemennou predispozíciou pre syndróm „Shar Pei autoinflammatory disease“ (SPAID). Popri typickej horúčke sa pri SPAID môžu prejavíť nasledovné symptómy: artritída, dermatitída, otitída, systémová amyloidóza, začervenania v oblasti kožných záhybov, zlepená a zhrubnutá koža, zápaly očí a opakujúce sa zápaly čriev. Prvé klinické príznaky sa objavujú vo veku 1 – 6 rokov. S ohľadom na komplexnosť ochorenia a variabilitu v čase nástupu klinických príznakov je SPAID porovnávaný s ľudskými autoimunitnými ochoreniami. V súvislosti so SPAID bola objavená mutácia na MTBP géne, ktorá veľmi úzko s ochorením súvisí.

Plemená: Shar Pei

Dedičnosť: autozomálne dominantná s neúplnou penetráciou (markerový test)

Materiál: Na genetický test je potrebné poslať 1 ml EDTA krvi, alternatívou môže byť ster z bukálnej sliznice. Sterové tampóny Vám radi zdarma poskytneme. V zriedkavých prípadoch nemusí genetický materiál z tampónu pre vyšetrenie postačovať. V takomto prípade sa odporúča poslanie vzorky EDTA krvi.

Dĺžka vyšetrenia: 3-4 pracovné dni po doručení vzorky do vyšetrujúceho laboratória

Otázky?

Pre bližšie informácie sme Vám k dispozícii:

Laboklin s.r.o.
Líščie údolie 57
84231 Bratislava
Tel.: +421 948 783 888
labor.ba@laboklin.com

